

Atualizado em 04 de maio de 2020.

APRESENTAÇÃO CLÍNICA DE PACIENTES COM SUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE INFECÇÃO POR SARS-COV-2.

Sintomas de trato respiratório superior:	<ul style="list-style-type: none"> Sintomas gerais como febre, mialgia, cefaleia, tosse seca, dor de garganta, coriza. Sem sinais de dispneia ou desidratação. Classificar em grupo A ou B para conduta específica.
Sintomas de trato respiratório inferior:	<ul style="list-style-type: none"> Cansaço e dificuldade para respirar que podem ser visualizados com: FR > 22ipm e SpO2: <92% Classificar como Grupo C ou D para conduta específica.
Casos graves:	<ul style="list-style-type: none"> Sinais desconforto respiratório como: frequência respiratória ≥ 30 ipm e/ou necessidade de pelo menos 2L/min de O2 para manter saturação > 92%, cianose de extremidades, alteração do nível de consciência. Alterações hemodinâmicas: PAM < 65mmHg ou PAS <90 mmHg
SRAG	<ul style="list-style-type: none"> PaO2/FiO2 <300; SpO2/FiO2: <315

AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA COMPLICAÇÃO DE ACORDO COM OS SINTOMAS RESPIRATÓRIOS.						
Fatores de risco para complicações clínicas	Sintomas respiratórios					
	Trato respiratório superior	Trato respiratório inferior				
Baixo risco	Grupo A	Grupo C				
Alto Risco	Grupo B	Grupo D				
<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #e0f2f1;"> Grupo A Avaliar oximetria de pulso Orientações sobre sinais e sintomas de alerta Se internação hospitalar: hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, troponina, D-dímero, DHL, coagulograma </td> <td style="background-color: #e0f2f1;"> Grupo C Avaliar oximetria de pulso TC de tórax Teste rápido para influenza e RT-PCR para SARS-CoV-2 Hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, troponina, D-dímero, DHL, coagulograma Iniciar oseltamivir se pesquisa viral não disponível Antibiótico se sinais de sepse Internação recomendada </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffe0b2;"> Grupo B Avaliar oximetria de pulso TC de tórax Teste rápido para influenza RT-PCR para SARS-CoV-2 Orientações sobre sinais e sintomas de alerta Se internação hospitalar: hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, troponina, D-dímero, DHL, coagulograma </td> <td style="background-color: #ffe0b2;"> Grupo D Avaliar oximetria de pulso TC de tórax Teste rápido para influenza e RT-PCR para SARS-CoV-2 Hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, troponina, D-dímero, DHL, coagulograma Iniciar oseltamivir se pesquisa viral não disponível Antibiótico se sinais de sepse Internação recomendada </td> </tr> </table>			Grupo A Avaliar oximetria de pulso Orientações sobre sinais e sintomas de alerta Se internação hospitalar: hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, troponina, D-dímero, DHL, coagulograma	Grupo C Avaliar oximetria de pulso TC de tórax Teste rápido para influenza e RT-PCR para SARS-CoV-2 Hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, troponina, D-dímero, DHL, coagulograma Iniciar oseltamivir se pesquisa viral não disponível Antibiótico se sinais de sepse Internação recomendada	Grupo B Avaliar oximetria de pulso TC de tórax Teste rápido para influenza RT-PCR para SARS-CoV-2 Orientações sobre sinais e sintomas de alerta Se internação hospitalar: hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, troponina, D-dímero, DHL, coagulograma	Grupo D Avaliar oximetria de pulso TC de tórax Teste rápido para influenza e RT-PCR para SARS-CoV-2 Hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, troponina, D-dímero, DHL, coagulograma Iniciar oseltamivir se pesquisa viral não disponível Antibiótico se sinais de sepse Internação recomendada
Grupo A Avaliar oximetria de pulso Orientações sobre sinais e sintomas de alerta Se internação hospitalar: hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, troponina, D-dímero, DHL, coagulograma	Grupo C Avaliar oximetria de pulso TC de tórax Teste rápido para influenza e RT-PCR para SARS-CoV-2 Hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, troponina, D-dímero, DHL, coagulograma Iniciar oseltamivir se pesquisa viral não disponível Antibiótico se sinais de sepse Internação recomendada					
Grupo B Avaliar oximetria de pulso TC de tórax Teste rápido para influenza RT-PCR para SARS-CoV-2 Orientações sobre sinais e sintomas de alerta Se internação hospitalar: hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, troponina, D-dímero, DHL, coagulograma	Grupo D Avaliar oximetria de pulso TC de tórax Teste rápido para influenza e RT-PCR para SARS-CoV-2 Hemograma, PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e frações, troponina, D-dímero, DHL, coagulograma Iniciar oseltamivir se pesquisa viral não disponível Antibiótico se sinais de sepse Internação recomendada					