


PROTOCOLO 2: MANEJO CLÍNICO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO PRONTO ATENDIMENTO.
Versão 03, 04 de maio de 2020.

ANEXO 2 – FLUXOGRAMA DE MANEJO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO.



<p>SINAIS DE ALERTA: Piora dos sintomas, como falta e ar, febre por mais de 3 dias, confusão mental, sensação de pressão baixa e piora da tosse.</p>	<p>GRUPO DE RISCO</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Idade > 60 anos</td> <td style="width: 33%;">Doença cardiovascular</td> <td style="width: 33%;">Paciente com tuberculose</td> </tr> <tr> <td>Criança < 5 anos</td> <td>Doença pulmonar</td> <td>Imunossupressão</td> </tr> <tr> <td>Gestante e puérpera</td> <td>Doença cerebrovascular</td> <td>Câncer</td> </tr> <tr> <td>Obeso (IMC > 40)</td> <td>Doença hematológica</td> <td>Uso de corticóide</td> </tr> <tr> <td>Diabéticos</td> <td>Doença renal</td> <td>Uso prolongado de anticoagulante (< 19 anos)</td> </tr> </table>			Idade > 60 anos	Doença cardiovascular	Paciente com tuberculose	Criança < 5 anos	Doença pulmonar	Imunossupressão	Gestante e puérpera	Doença cerebrovascular	Câncer	Obeso (IMC > 40)	Doença hematológica	Uso de corticóide	Diabéticos	Doença renal	Uso prolongado de anticoagulante (< 19 anos)
Idade > 60 anos	Doença cardiovascular	Paciente com tuberculose																
Criança < 5 anos	Doença pulmonar	Imunossupressão																
Gestante e puérpera	Doença cerebrovascular	Câncer																
Obeso (IMC > 40)	Doença hematológica	Uso de corticóide																
Diabéticos	Doença renal	Uso prolongado de anticoagulante (< 19 anos)																
<p>ORIENTAÇÕES PARA A ALTA: Dentro do possível, manter distância de familiares e evitar compartilhamento de utensílios domésticos. Evitar receber visitas e frequentar locais públicos, a menos que essa exposição seja de extrema necessidade; Acompanhamento pela ESF a cada 24 para pacientes do grupo de risco e 48h para os demais, preferencialmente por telefone; Se familiares desenvolverem sintomas, orienta-los a procurar atendimento Proteger com lenço de papel nariz e boca sempre que tossir e espirrar; Fornecer atestado por 14 dias para o paciente e contatos domiciliares, a contar do início dos sintomas. Caso o diagnóstico seja descartado, o afastamento poderá ser encerrado. Realizar higienização das mãos com frequência e orientar as pessoas próximas que façam o mesmo.</p>																		