

Atualizado em 04 de maio de 2020.

ORIENTAÇÃO DE MANEJO DE PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARA SARS-COV-2.					
	ONDE MONITORAR?	MEDICAÇÕES SINTOMÁTICAS	OSELTAMIVIR¹	TERAPIA ANTIMICROBIANA²	TERAPIA COM CLOROQUINA³
Caso suspeito ou confirmado assintomático ou do Grupo A	CASA	●	✘	✘	✘
Caso suspeito do Grupo B	CASA	✓	●	●	✘
Caso suspeito do Grupo C	HOSPITAL	✓	●	●	✘
Caso confirmado do Grupo B	CASA	✓	✘	✘	✘
Caso confirmado do Grupo C	HOSPITAL	✓	✘	✘	✘
Caso suspeito com sintomas graves ⁴ ou do Grupo D	HOSPITAL ou UTI	✓	✓	✓	✘
Caso confirmado com sintomas graves ⁴ ou do Grupo D	HOSPITAL ou UTI	✓	✘	●	✓
Caso suspeito com SRAG ⁵	UTI	✓	✓	✓	●
Caso confirmado com SRAG ⁵	UTI	✓	●	●	✓

✓ Indicado

✘ Não indicado

● Considerar

1 Considerar para pacientes do grupo de risco para influenza grave: cardiopatias, Pneumopatias, nefropatias, hemoglobinopatias, imunodepressão, diabetes, obesidade, gestantes/puérperas.

2 Considerar para pacientes com sintomas sugestivos de pneumonia.

3 Considerar para pacientes do grupo de risco para pior prognóstico e com radiológicos e laboratoriais sugestivos de infecção pelo SARS-CoV-2.

4 Frequência respiratória ≥ 30 ipm; SpO₂ $\leq 93\%$ ou necessidade de 5l/min de O₂ para manter saturação $> 93\%$.

5 PaO₂/FiO₂ < 300 ; SpO₂/FiO₂ < 315 .