

Atualizado em 04 de maio de 2020.

MEDIDAS FARMACOLÓGICAS DE SÍNDROMES GRIPAIS

Droga	Posologia segundo faixa etária	
	Adultos	Crianças
Oseltamivir	75mg VO 12/12 horas, por 5 dias	Menores de 1 ano: 0 a 8 meses: 3mg/kg, 12/12h, por 5 dias 9 a 11 meses: 3,5mg/kg, 12/12h, por 5 dias ≤ 15 kg: 30mg, 12/12h por 5 dias 15 a 23 kg: 45mg, 12/12h por 5 dias 23 a 40 kg: 60mg, 12/12h, por 5 dias > 40 kg: 75mg, 12/12h, por 5 dias
Azitromicina	250-500mg/cp uma vez por dia	10mg/kg/dia EV ou VO uma vez por dia

*Não usar em recém-nascido (≤ 28 dias)

CONDIÇÕES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES EM CASOS DE SÍNDROME GRIPAL COM RECOMENDAÇÃO PARA USO DE OSELTAMIVIR

- Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto (aborto ou perda fetal).
- Adultos ≥ 60 anos.
- Crianças < 5 anos (maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos com maior taxa de mortalidade).
- População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso.
- Indivíduos menores de 19 anos em uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco de síndrome de Reye).
- Indivíduos que apresentem:
 - › Pneumopatias (incluindo asma).
 - › Pacientes com tuberculose de todas as formas.
 - › Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica).
 - › Nefropatias ou Hepatopatias.
 - › Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme).
 - › Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus).
 - › Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que comprometem a função respiratória ou aumentam o risco de aspiração.
 - › Imunodeprimidos associada a medicamentos, neoplasias, HIV/aids ou outros.
 - › Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC ≥ 40 em adultos).

DOSE DE OSELTAMIVIR PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL

Clearance de Creatinina	Tratamento 5 dias	Profilaxia 10 dias
Leve: Clearance > 60-90 ml/min	75 mg 12/12 h	30 mg 1 vez por semana imediatamente após troca da diálise**
Moderado: Clearance > 30-60 ml/min	30 mg 12/12 h	
Severo: Clearance > 10-30 ml/min	30 mg 1 vez ao dia	
Hemodiálise: Clearance ≤ 10 ml/min	30 mg após cada sessão de hemodiálise*	
Diálise Peritoneal Contínua ambulatorial: Clearance ≤ 10 ml/min	Única dose de 30 mg administrada imediatamente após troca da diálise	

*1 dose após cada sessão de hemodiálise, considerando que em cinco dias, serão realizadas três sessões.

**Serão duas doses de 30 mg cada, considerando que em dez dias, ocorrerão duas sessões de diálise.